



Hable con su médico sobre DAYBUE™

En esta guía encontrará información útil sobre DAYBUE y algunas preguntas para ayudarle a prepararse para una conversación con el médico de su hijo.

Indicación

DAYBUE es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar el síndrome de Rett en adultos y niños de 2 años de edad o más. No se sabe si DAYBUE es seguro y eficaz en niños menores de 2 años de edad.

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de DAYBUE?

- **Diarrea:** La diarrea es un efecto secundario frecuente de DAYBUE que a veces puede ser grave. La diarrea puede hacer que pierda demasiada agua de su cuerpo (deshidratación). Antes de iniciar el tratamiento con DAYBUE, deje de tomar laxantes. Informe a su proveedor de atención médica si tiene diarrea mientras toma DAYBUE. Su proveedor de atención médica puede pedirle que aumente la cantidad que bebe o que tome medicamentos antidiarreicos según sea necesario.

Consulte la **Información importante de seguridad en la página 4**.
Lea la **Información de prescripción completa**, incluida la **Información para el paciente**.

El síndrome de Rett es un trastorno complejo del neurodesarrollo que suele estar causado por una mutación o cambio en el gen *MECP2*.

DAYBUE es el primer y único tratamiento aprobado por la FDA para adultos y niños a partir de 2 años con síndrome de Rett.

Ahora que hay un tratamiento aprobado para el síndrome de Rett, es posible que se pregunte si DAYBUE es adecuado para su hijo. **Su médico puede ayudarle a decidir esto, y las siguientes preguntas pueden ayudar a guiar su conversación.**



Qué buscar

- ¿Qué síntomas podrían ayudar a abordar DAYBUE?
- ¿Cuándo podría empezar a ver alguna mejoría?
- ¿Las mejorías son las mismas para todos?
- ¿Se detendrán las mejorías si mi hijo deja de tomar DAYBUE?
- ¿Durante cuánto tiempo tendrá que tomar DAYBUE mi hijo?



Cómo decidir si DAYBUE es adecuado para su hijo

- ¿Para quién es DAYBUE?
- ¿DAYBUE sustituye a otros medicamentos que está tomando mi hijo?
- ¿Cuánto DAYBUE deberá tomar mi hijo?
- ¿Cómo interactuará DAYBUE con otros medicamentos que tome mi hijo?

Información importante de seguridad (continuación)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de DAYBUE? (continuación)

- **Pérdida de peso:** DAYBUE puede provocar pérdida de peso. Informe a su proveedor de atención médica si nota que está perdiendo peso en cualquier momento durante el tratamiento con DAYBUE.
- **Los efectos secundarios más frecuentes de DAYBUE fueron diarrea y vómitos.** Otros efectos secundarios incluyen fiebre, convulsiones, ansiedad, disminución del apetito, cansancio y resfriado común. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DAYBUE. Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le preocupe o no desaparece.

Consulte la información importante de seguridad en la página 4.



Cómo comenzar con DAYBUE

- ¿Tengo que hacer algo por adelantado para preparar a mi hijo para tomar DAYBUE por primera vez?
- ¿Debería informar a otras personas del equipo de atención de mi hijo que están iniciando este tratamiento?
- ¿Hay algún programa o recurso de apoyo disponible para ayudarnos a empezar?



Cómo tomar DAYBUE

- ¿Cómo se administra DAYBUE?
- ¿Puedo seguir administrando DAYBUE si mi hijo tiene una sonda de gastrostomía (gastrostomy tube, G-tube) o sonda gastroyeyunal (gastrojejunal tube, GJ-tube)?
- ¿Cuánto DAYBUE deberá tomar mi hijo?
- ¿Hay algún consejo de administración que pueda dar?
- ¿Cómo sabe DAYBUE?
- ¿Qué pasa si tenemos que viajar, cómo llevamos DAYBUE con nosotros?
- ¿Qué sucede si mi hijo se salta una dosis?
- ¿Cómo/dónde debo almacenar DAYBUE?



Tratamiento de los posibles efectos secundarios

- ¿Existen posibles efectos secundarios de DAYBUE?
- ¿Cuántas personas experimentaron los efectos secundarios?
- Si se producen efectos secundarios, ¿cómo los trato?
- ¿Hay alguna información sobre el uso de DAYBUE a largo plazo?
- ¿Cuáles son los signos de que debo llamar a mi médico para obtener más ayuda?

Para obtener más información sobre DAYBUE, visite [DAYBUE.com](https://www.daybue.com).

Consulte la Información importante de seguridad en la página 4.

Indicación e información importante de seguridad

¿Qué es DAYBUE?

DAYBUE es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar el síndrome de Rett en adultos y niños de 2 años de edad o más. No se sabe si DAYBUE es seguro y eficaz en niños menores de 2 años de edad.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de DAYBUE?

- **Diarrea:** La diarrea es un efecto secundario frecuente de DAYBUE que a veces puede ser grave. La diarrea puede hacer que pierda demasiada agua de su cuerpo (deshidratación). Antes de iniciar el tratamiento con DAYBUE, deje de tomar laxantes. Informe a su proveedor de atención médica si tiene diarrea mientras toma DAYBUE. Su proveedor de atención médica puede pedirle que aumente la cantidad que bebe o que tome medicamentos antidiarreicos según sea necesario.
- **Pérdida de peso:** DAYBUE puede provocar pérdida de peso. Informe a su proveedor de atención médica si nota que está perdiendo peso en cualquier momento durante el tratamiento con DAYBUE.
- **Los efectos secundarios más frecuentes de DAYBUE fueron diarrea y vómitos.** Otros efectos secundarios incluyen fiebre, convulsiones, ansiedad, disminución del apetito, cansancio y resfriado común. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DAYBUE. Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le preocupe o no desaparece.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar DAYBUE?

Antes de tomar DAYBUE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- tiene problemas renales.
- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si DAYBUE dañará al feto.
- está amamantando o planea hacerlo. No se sabe si DAYBUE pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor forma de alimentar a su bebé mientras toma DAYBUE.

Informe a su proveedor de atención médica de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar DAYBUE con ciertos medicamentos puede afectar al funcionamiento de los otros medicamentos y puede causar efectos secundarios graves.

Se recomienda que notifique los efectos secundarios negativos de fármacos de venta con receta a la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088. También puede llamar a Acadia Pharmaceuticals Inc. al 1-844-4ACADIA (1-844-422-2342).

DAYBUE está disponible en forma de solución oral (200 mg/ml).

La información sobre riesgos que se proporciona aquí no es completa. Para obtener más información, hable con su proveedor de atención médica y lea la [Información para el paciente que la acompaña](#). Visite DAYBUE.com para obtener la [Información de prescripción completa](#).